

Para publicación inmediata
15 de abril de 2011

Contacto de prensa: Chris J. Minnick
Celular: 575-649-0754

El Departamento de Salud y la Mesa Directiva de Ganadería advierten sobre el riesgo del microbio de la Salmonela en los pollitos y patitos

(Santa Fe) – El Departamento de Salud de Nuevo México y la Mesa Directiva de Ganadería aconseja a las familias que eviten el posible contagio de Salmonela no regalando pollitos ni patitos a los niños con motivo de la Pascua. En los últimos cinco años, Nuevo México ha tenido 15 casos de salmonela relacionados con pollitos. Muchos de estos casos se vieron en niños pequeños.

Este año varios de los otros estados están investigando casos de Salmonela relacionados con pollitos. Muchos pollitos y aves pequeñas son portadores de la salmonela en sus heces, y es difícil saber si los animales eran portadores de la Salmonela porque generalmente no demuestran señales de estar enfermos.

“Mientras que hay muchas razones buenas para comprar pollitos, estamos pidiendo a las tiendas de alimentos para animales en todo el estado que firmemente desalienten a las personas que quieren comprar pollitos como mascotas, especialmente si tienen niños pequeños,” dijo la Secretaria del Departamento de Salud, Dra. Catherine Torres.

Los síntomas tempranos de la Salmonela en las personas incluyen fiebre, diarrea y dolor abdominal. Estos síntomas se desarrollan dentro de uno a 3 días después de haber sido expuestos a los pollitos y a sus heces. Otros síntomas pueden ser náusea, escalofríos o dolores de cabeza.

“Los niños se han infectado con Salmonela cuando los padres dejan a los pajaritos en la casa y dejan que sus niños pequeños los acaricien y se acerquen a ellos,” dijo el Dr. Paul Ettestad, Veterinario de Salud Pública del Departamento de Salud. “En otros casos, los padres no se lavaron las manos apropiadamente después de tocar a los pájaros y les pasaron indirectamente la infección a sus niños.”

El Departamento de Salud también recomienda las siguientes medidas preventivas:

- Lávese las manos muy bien con jabón y agua inmediatamente después de tocar aves pequeñas vivas o cualquier cosa en el área donde ellos viven o vagan. Use un desinfectante para las manos si el jabón y el agua no están disponibles fácilmente.
- Los adultos deben de supervisar el lavado de manos para los niños pequeños.
- No acaricie ni bese a los pájaros, toque su boca o coma o beba cerca de las aves pequeñas vivas.

- No deje a ningún ave pequeña viva dentro de la casa o en áreas donde se prepara la comida o la bebida, donde se sirven o se guardan los alimentos o bebidas, tales como las cocinas, las alacenas o los patios al aire libre.
- No limpie ningún equipo o materiales asociados con el criar o cuidar a las aves vivas, como las jaulas o las vasijas para darles comida o agua, en la casa.
- No deje que los niños menores de 5 años toquen a los pollitos, a los patitos, o a otras aves vivas.
- Visite a su doctor si le dan dolores en el abdomen, fiebre y/o diarrea.

Para mayor información sobre la infección de Salmonela proveniente de las aves pequeñas, visite el sitio de la Internet de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en: <http://www.cdc.gov/Features/SalmonellaBabyBirds/>

###