



INFORMACIÓN IMPORTANTE y PRIVADA SOBRE SU SALUD POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN CON MUCHA ATENCIÓN

INDICACIONES PARA TOMAR CEFPODOXIMA

Su pareja sexual ha recibido recientemente tratamiento para la gonorrea (también se llama purgación o en inglés “the clap”). La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que se puede curar y se puede contraer al tener relaciones sexuales con una persona infectada. Algunas de las personas que tienen gonorrea no saben que la tienen porque no tienen ningún síntoma y se sienten bien.

-Los hombres pueden notar una secreción del pene de color amarillento o verdoso, dolor o malestar al orinar o dolor e hinchazón de los testículos.

-Las mujeres pueden notar un flujo vaginal anormal, dolor al tener relaciones sexuales, sangrado entre los periodos menstruales o después de tener relaciones sexuales, dolor o retorcijones en la parte baja del vientre o pelvis o dolor al orinar. Las mujeres, si no reciben tratamiento, pueden quedar estériles (no podrán tener hijos en el futuro).

-Tanto en los hombres como en las mujeres la gonorrea puede causar una infección en la garganta (por medio del sexo oral) o en el recto (por medio del sexo anal).

No importa si ahora mismo tiene o no cualquiera de estos síntomas, usted puede tener gonorrea. Es importante que tome esta medicina para prevenir que se enferme. También, usted puede volver a infectar a su pareja si tiene relaciones sexuales sin protección (sin usar un condón) antes de haberse curado de esta enfermedad.

Después de haber tomado esta medicina, lo mejor es que vaya a su médico o profesional de la salud para un chequeo de enfermedades de transmisión sexual, terapia y, posiblemente, le hagan una prueba para detectar otras enfermedades de transmisión sexual. Si no tiene médico o no tiene seguro médico, puede recibir atención médica gratuita del Departamento de Salud (llame a su oficina de salud más próxima para saber cuando le pueden atender).

Antes de tomar esta medicina, por favor lea la siguiente información:

La cefpodoxima es un antibiótico de cefalosporina muy seguro. Sin embargo, **NO LO TOME si usted cumple alguna de estas afirmaciones:**

- Usted es una mujer que tiene dolor en la parte baja del vientre o siente dolor al tener relaciones sexuales, tiene vómitos o fiebre.

- Está embarazada.
- Usted es un hombre y siente dolor o tiene hinchazón en los testículos o fiebre.
- Si usted ha tenido alguna vez alguna reacción adversa, como un sarpullido (urticaria o ronchas) o alergia a la penicilina o a un antibiótico relacionado (como la ampicilina, amoxicilina u otro antibiótico de cefalosporina).
- Si usted tiene una enfermedad crónica grave del riñón, corazón o hígado, o un trastorno convulsivo (sufre convulsiones).
- Si ahora mismo está tomando alguna otra medicina con receta médica.

Si usted cumple alguna de estas circunstancias anteriores, debe hablar con su médico lo antes posible.

Algunas personas pueden sufrir diarrea, náusea, retorcijones, indigestión, un sarpullido, dolor de cabeza, vómitos, picazón o una infección vaginal por hongos después de haber tomado cefpodoxima. Estos síntomas no duran mucho tiempo, pero si persisten, póngase en contacto con su médico.

Si nota otros efectos secundarios o una reacción alérgica (como un sarpullido, picazón, hinchazón, mareos o problemas para respirar) debe llamar a su médico inmediatamente.

Tome las dos tabletas de cefpodoxima con un vaso de agua o con comida. Es importante que tome esta medicina lo antes posible para que pueda curarse.

No comparta esta medicina ni tampoco se la dé a nadie.

No tenga relaciones sexuales durante los siete días después de haber tomado la medicina. **Son necesarios siete días para estar seguro de que esta medicina tenga efecto y cure la gonorrea.** Si usted tiene relaciones sexuales sin protección (sin usar un condón) cualquiera de los siete días después de haber tomado la medicina, todavía puede infectar a sus parejas sexuales. Aunque los condones son efectivos, la forma más segura de no pasarle la infección a nadie es no tener relaciones sexuales por siete días después de haber tomado la medicina.

Si usted tiene preguntas sobre la cefpodoxima o la gonorrea, o para obtener el número de teléfono de su oficina de salud más próxima, por favor llame:

- Albuquerque: Stanford Clinica de STD Teléfono 505: 841-4180
- Roswell: Oficina de Salud Publica DPS Teléfono 575: 347-2409 Ext 6216
- Las Cruces: Oficina de Salud Publica Teléfono 575: 528-5000
- Farmington: Oficina de Salud Publica Teléfono 505: 327-4461
- Santa Fe: Oficina de Salud Publica Teléfono 505: 476-2600

Todas las llamadas son confidenciales. **Nadie le preguntará su nombre.**