



División de Epidemiología y Respuesta

BOLETÍN SEMANAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO PILOTO PARA LA VIGILANCIA CENTINELA DE LA INFLUENZA EN LA FRONTERA

Temporada de influenza 2008-2009

Informe para la semana que termina el 22 de noviembre, 2008 (Semana 47)

Región	Nivel de actividad de la influenza (véase más abajo una descripción de los niveles)
Región fronteriza de Nuevo México/Chihuahua	Sin actividad
Nuevo México	Sin actividad

Resumen de la actividad de la influenza en la frontera en la región del suroeste de Nuevo México/norte de Chihuahua para la semana que termina el 22 de noviembre, 2008¹:

Los 8 sitios de vigilancia centinela de la influenza situados dentro de los 100 kilómetros de la frontera de Nuevo México/México reportaron un total de **1815** visitas de pacientes para el periodo del reporte, de las cuales **9(0.5%)** fueron positiva como enfermedades con síntomas similares a los de la influenza (ESI)².

Clínica	Pacientes atendidos en la semana que termina: 22 de noviembre, 2008	Pacientes con ESI este semana (n; % del total de esta semana):	Pacientes con ESI la semana pasada (n; % del total de la semana pasada):
Centro Salud "B", Juarez	263	1(0.4%)	0
Aguilas de Zaragoza, Juarez	71	0	1(1.1%)
Anapra CAAPS, Juarez	525	0	0
BAHC, Columbus	71	0	0
BAHC, Deming	146	0	0
BAHC, Doña Ana	387	3(0.8%)	1(0.2%)
HMS, Lordsburg	180	5(2.8%)	1(0.6%)
LCDF, Sunland	172	0	0
Totales:	1815	9(0.5%)	3(0.2%)

¹ Los datos semanales de ESI y laboratorio pueden variar a medida que se van compilando reportes adicionales.

² Actividad similar a la influenza (ESI) se define como Fiebre ($\geq 100^{\circ}\text{F}$ [37.8°C], oral o equivalente) Y tos y/o dolor de garganta si no existe otra causa CONOCIDA para estos síntomas más que la influenza.

Resumen de la actividad centinela de laboratorio³ en la frontera de Nuevo México y Juárez para la semana que termina el 22 de noviembre, 2008:

Clínica/Laboratorio ⁴ Temporada de influenza 2007-2008	Número de pruebas realizadas ⁴	Positivas Tipo A (nº,%)	Positivas Tipo B (nº,%)	Positivas Tipo desconocido ⁵ (nº,%)	Total pruebas positivas Todos los tipos (nº,%)
Centro Salud "B", Juarez	1	0	0	0	0
Aguilas de Zaragoza, Juarez	0	0	0	0	0
Anapra, Juarez	0	0	0	0	0
Gila Regional Medical Center, Silver City	0	0	0	0	0
Memorial Medical Center, Las Cruces	2	0	0	0	0
Mimbres Memorial, Deming	16	6	0	0	0
Mountain View Medical Center, Las Cruces	No Informe				
Totales	19	6(32%)	0	0	0


Vigilancia de la influenza y actividad de laboratorio nacionales para la semana que termina el 22 de noviembre, 2008:

Se puede encontrar más información sobre la vigilancia nacional en la página de Internet de los CDC <http://www.cdc.gov/flu/weekly/>.

³ Incluye pruebas rápidas de detección de antígeno e inmunofluorescencia (es decir, tinción directa de anticuerpos fluorescentes)
Nota: La sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico rápido administradas en el lugar de atención médica varían cuando la influenza no está circulando de forma generalizada. El Programa de Vigilancia de la influenza de Nuevo México anticipa que haya algunos falsos positivos fuera del periodo de máxima actividad de la influenza (es decir, al comienzo y al final de la temporada). El primer caso confirmado por laboratorio de Nuevo México para la temporada de influenza se basa en el resultado positivo de un cultivo viral.

⁴ La disponibilidad de pruebas de influenza y los criterios clínicos para realizar las pruebas puede que no sean consistentes y varíen entre las diferentes clínicas o personal clínico.

⁵ No todas las pruebas rápidas para la influenza realizadas en el lugar de atención médica pueden distinguir entre la influenza tipo A y B.



Nivel de actividad	Actividad ESI*/Brotos		Datos de laboratorio
Sin actividad	Baja	Y	No hay casos confirmados por laboratorio [†]
Esporádica	No ha aumentado	Y	Casos aislados confirmados por laboratorio
	O		
Local	No ha aumentado	Y	Brote confirmado por laboratorio en una institución [‡]
	Aumento de ESI en una región**; la actividad ESI en otras regiones no ha aumentado	Y	Hay evidencia reciente confirmada por laboratorio (en las últimas 3 semanas) de la influenza en la región y hay aumento de ESI
Regional (no se aplica a estados que tienen menos de 4 regiones)	O		
	Hay 2 o más brotes en instituciones (ESI o confirmados por laboratorio) en una región; la actividad ESI en otras regiones no ha aumentado	Y	Hay evidencia reciente confirmada por laboratorio (en las últimas 3 semanas) de la influenza en la región donde hay brotes; la actividad del virus no es mayor que la actividad esporádica en otras regiones
Regional (no se aplica a estados que tienen menos de 4 regiones)	Aumento de ESI en 2 o más regiones pero en menos de la mitad de las regiones	Y	Confirmación reciente por laboratorio (en las últimas 3 semanas) de la influenza en las regiones afectadas
	O		
Regional (no se aplica a estados que tienen menos de 4 regiones)	Brotos en instituciones (ESI o confirmados por laboratorio) en 2 o más regiones pero en menos de la mitad de las regiones	Y	Confirmación reciente por laboratorio (en las últimas 3 semanas) de la influenza en las regiones afectadas
	Extendida	Aumento de ESI y/o brotes en instituciones (ESI o confirmados por laboratorio) en al menos la mitad de las regiones	Y

*Enfermedad similar a la influenza (ESI): Fiebre ($\geq 100^{\circ}\text{F}$ [37.8°C], oral o equivalente) y o dolor de garganta (si no existe otra causa conocida para los síntomas más que la influenza)

[†] Caso confirmado por laboratorio = caso confirmado mediante prueba de diagnóstico rápido, detección de antígeno, cultivo o RCP. Hay que llevar cuidado cuando se basa en los resultados obtenidos de las pruebas de diagnóstico rápido en el lugar de atención médica cuando la influenza no se encuentra circulando de forma generalizada. La sensibilidad y especificidad de estas pruebas varían y el valor positivo que indica puede, en realidad, ser bajo fuera del periodo de máxima actividad de influenza. Por lo tanto, es posible que un estado quiera obtener confirmación por laboratorio de la influenza usando otros métodos que no sean la prueba rápida administrada en el lugar de atención médica para reportar el primer caso confirmado por laboratorio de influenza de la temporada.

[‡] Una institución puede ser una residencia para ancianos, hospital, prisión, escuela, etc.

**Región: población que se encuentra dentro de la vigilancia en una subdivisión geográfica definida de un estado. Una región puede estar formada por uno o más condados y se basa en las circunstancias especiales de cada estado. Dependiendo del tamaño del estado, el número de las regiones puede variar de 2 a 12 aproximadamente. La definición de las regiones se deja en manos del estado pero se pueden usar los distritos de salud que ya existen en muchos estados. Al permitir que los estados definan las regiones, se evitan, al menos en parte, las líneas arbitrarias de los condados y les permite a los estados hacer divisiones que tengan sentido basadas en grupos de población geográfica. Al centrarse en regiones más grandes que los condados, se consigue mejorar también la posibilidad de que los datos necesarios para calcular la actividad estén disponibles.

Esta información es recolectada por la Agencia de Epidemiología de las Enfermedades Infecciosas de la División de Epidemiología y Respuesta del Departamento de Salud de Nuevo México. Si tiene preguntas, por favor comuníquese al 505-827-0006. Para obtener más información sobre la influenza vaya a la página de Internet del Departamento de Salud de Nuevo México: <http://www.health.state.nm.us/flu/> o la páginas de los CDC: <http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/flu/fluivirus.htm>