



FICHA DE DATOS

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre los hispanos en Nuevo México

Los hispanos en los Estados Unidos experimentan una carga desproporcionada de infecciones por causa del VIH, con desigualdades importantes con respecto a su salud, observadas en las regiones geográficas y en los sub-grupos de la población.¹ Por ejemplo, en los Estados Unidos, el riesgo calculado para adquirir una infección VIH en toda una vida entre los hispanos es de casi el 2%, o 1 en 50 personas.² Para el VIH+ hispanos, las desigualdades en la salud pueden resultar en una calidad de vida disminuida, en la pérdida de oportunidades económicas, y en percepciones de injusticia.

Los diagnósticos nuevos de VIH


- Los hispanos constituyen casi el 43% de la población³ de Nuevo México. En 2009, se reportaron nuevos casos del VIH en un 48% de los hispanos en Nuevo México (Figura 1). La tasa de diagnósticos nuevos del VIH para los hispanos en Nuevo México fue de 9 por 100,000 personas.
- A pesar de pequeñas fluctuaciones en el número de nuevos casos del VIH, la tasa entre los hispanos ha permanecido relativamente estable en los cinco años pasados (Figura 2).
- En 2008 los hispanos tuvieron más del 19% de diagnósticos nuevos del VIH en los EE.UU.⁴ La tasa de diagnósticos nuevos de infección del VIH en los hispanos fue de 25 por 100,000 personas.⁵ También la tasa de diagnóstico del VIH entre los hispanos en los EE. UU. fue aproximadamente 3 veces más alta que la de los blancos.⁶
- En Nuevo México, la proporción de hispanos con un diagnóstico positivo del VIH conllevado con el de SIDA (46%) fue más alta que la de los blancos no hispanos, los afro-americanos, los nativo americanos o nativos de Alaska (AI/AN).⁷ La alta proporción encontrada entre los hispanos en Nuevo México también se ha visto a nivel nacional.⁸




Personas que están viviendo con VIH/SIDA

De las más de 3,300 personas que viven con VIH en Nuevo México, el 39% son hispanos (Figura 3). La mayoría de los hispanos que viven con VIH residen en los condados de Bernalillo y Doña Ana.

- Como en los otros grupos raciales o étnicos, la manera de haberse expuesto que se reporta más comúnmente entre los VIH+ hispanos en Nuevo México es de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (MSM; Figura 4).



- Entre las mujeres hispanas que viven con VIH en Nuevo México, más de la mitad, (56%) reportaron haber tenido relaciones sexuales muy riesgosas, heterosexuales, (HRH) como la manera de haberse expuesto, lo que incluye contacto con una persona que tiene, o está en alto riesgo de contraer el VIH.
- Aproximadamente el 21% de mujeres hispanas que viven con VIH reportaron el uso de drogas inyectadas (IDU) como la manera de alto riesgo de haber estado expuestas al VIH. Este porcentaje es menor (23%) en el estado, si se compara con el de las mujeres blancas, (28%), y con las afro-americanas (22%).



La prevención y el movimiento de defensa

El Día Latino Nacional de Información sobre SIDA (NLAAD por sus siglas en inglés), que se estableció en 2003, es una de las campañas para alcanzar a la comunidad más grandes y anchas en la nación que se enfoca en promover las oportunidades para hacerse la prueba del VIH, conectando a las personas a los cuidados de salud y realizando el conocimiento sobre VIH entre los hispanos. NLAAD busca difundir el conocimiento del impacto desproporcionado del VIH en la población hispana en los Estados Unidos y motivar a que se tomen medidas de prevención tales como hacerse la prueba para el VIH.

El nuevo Concilio Latino de Asesoría en Nuevo México (NM-LAC) se formó en 2008 para ayudar en la evaluación, planeación e implementación de proyectos que benefician a los hombres gay o bisexuales que son latinos o hispanos. El NM-LAC brindó apoyo técnico durante una evaluación de los servicios de prevención del VIH en las comunidades en todo el estado. Esta evaluación llevó a la implementación de programas que alientan a hacerse las pruebas para el VIH, brindan educación novedosa y culturalmente específica, y ofrecen oportunidades para construir redes sociales. El reporte de este proyecto, el extenso “Plan de Prevención de VIH en Nuevo México, 2009-2011: *Suplemento sobre los hombres latinos Gay y Bisexuales*” está disponible en la Internet en: www.nmcpag.org.

El Programa para la Prevención del VIH ha aplicado modelos basados en evidencia para crear materiales culturalmente apropiados para las poblaciones hispanas, para prevenir el estigma negativo de hacerse la prueba del VIH. La eficacia cultural y del idioma, así como la perspectiva de los clientes sobre la salud y sobre los cuidados de la salud, influyen a los asuntos de prevención y tratamiento.

NOTAS:

NMDOH categoriza a las personas como hispanas si su raza es blanca o si no se conoce; todas las otras etnias hispanas se clasifican de acuerdo con su grupo racial. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) categorizan como hispanos a aquéllos de etnia hispánica, sin importar su raza. Para este reporte, nosotros seguimos la metodología del Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) para categorizar la raza y la etnia. Cuando se calcula la raza o la etnia en los casos de Nuevo México usando la metodología de los CDC, los porcentajes y tasas de Nuevo México no son drásticamente diferentes de los porcentajes y tasas calculados usando la metodología del NMDOH

Publicaciones consultadas

1. Los cálculos de los sub-poblaciones del sistema de vigilancia de los incidentes del VIH – Estados Unidos, 2006. Nombre de la publicación en inglés: *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2008; 57(36):985-9.
2. Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Riesgo calculado en el lapso de vida para ser diagnosticado con una infección de VIH entre los hispanos o latinos — 37 estados y Puerto Rico, 2007. *MMWR* 2011; 59(40):1297-1301. (Publicación en inglés)
3. Datos para 2009 de la Oficina de Investigación de Negocios y Economía de la Población en Nuevo México. Disponible en: www.unm.edu/~bber
4. Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. CDC HIV/AIDS Hoja de Datos: VIH/SIDA entre los hispanos o latinos, Diciembre 2010. disponible en: <http://www.cdc.gov/hiv/hispanics/resources/factsheets/pdf/hispanic.pdf>
5. Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Reporte de la vigilancia del VIH, 2008; volumen 20. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/> Publicado en junio 2010. Se accedió en enero 13, 2011
6. Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Reporte de los CDC sobre las Desigualdades e Injusticias en la Salud – Estados Unidos 2011. Publicación en inglés: *MMWR* 2011; 60 (Suplemento): 87-89.
7. Programa de Epidemiología para el VIH y la Hepatitis del NMDOH, (2010) Diagnóstico conllevadas de VIH y SIDA en Nuevo México. Reporte trimestral del verano en julio.
8. Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (2009) Casos de infección el VIH y de SIDA en los Estados Unidos y subáreas dependientes, por raza y etnia, 2002–2006. Reporte Suplemental de Vigilancia del VIH – 13(1) http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/2008supp_vol13no1/default.htm